

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة الاستدراكية 2017
- الموضوع -

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي



المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

RS 34

3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والارض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	الشعبة أو المسلك


لا يسمح باستعمال الآلة الحاسبة

المكون الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

- I. عرّف (ي) ما يلي : الأوفوليت - بنية مورقة. (1 ن)
II. أذكر (ي) ثلاث خاصيات بنيوية وصخرية مميزة لسلاسل الطوف. (0.75 ن)
III. يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات التالية المرقمة من 1 إلى 4. أنقل (ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك، ثم أكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح: (2 ن)
(... ، 1) (... ، 2) (... ، 3) (... ، 4)

1- المتتالية التحولية للصخور الطينية الناتجة عن تحول متزايد الشدة هي: أ. طين ← غنايس ← شيبست ← ميكاشيست. ب. طين ← شيبست ← غنايس ← ميكاشيست. ج. طين ← شيبست ← ميكاشيست ← غنايس. د. طين ← غنايس ← ميكاشيست ← شيبست.	2- يحاط الكرانيت الإنداسي ب: أ. صخور الميكمايت. ب. هالة التحول. ج. صخور الغنايس. د. صخور البيريدوتيت.
3 - الإكلوجيت صخرة متحولة تشكلت في الظروف الآتية: أ. ضغط ودرجة حرارة مرتفعين. ب. ضغط مرتفع ودرجة حرارة منخفضة. ج. ضغط منخفض ودرجة حرارة مرتفعة. د. ضغط ودرجة حرارة منخفضين.	4 - الميكمايت مركب صخري يفصل: أ. بين صخور تحول التماس ومجال الانصهار. ب. بين صخور التحول الدينامي ومجال الانصهار. ج. بين الكرانيت الأناتيكتي والكرانيت الإنداسي. د. بين صخور الغنايس والكرانيت الأناتيكتي.

IV. تمثل الأشكال أسفله تشوهات تكتونية مصاحبة لتشكل السلاسل الجبلية.



الشكل 5

الشكل 4

الشكل 3

الشكل 2

الشكل 1


- أنقل (ي) على ورقة تحريرك أرقام الأشكال ثم أنسب (ي) لكل شكل الاسم المناسب من بين الأسماء الآتية:
تراكب، فالق عادي، فالق معكوس، فالق أفقي، طية مستقيمية، طية مائلة، طية راقدة. (1.25 ن)

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول (5 نقط)

يلجأ بعض الرياضيين إلى الغش في المسابقات الرياضية بتناولهم للمنشطات المحظورة من طرف اللجنة الدولية الأولمبية. لدراسة تأثير التدايب الرياضية وتناول المنشطات على التفاعلات الاستقلابية المنتجة للطاقة على مستوى الخلايا العضلية عند هؤلاء الرياضيين، نقترح المعطيات الآتية:

● مكن قياس تركيز بعض المواد الاستقلابية على مستوى عضلة هيكلية مخططة، وتحديد نسب استهلاك الكليكوز والفوسفوكرياتين عند سباحي مسافة 100 متر و 1500 متر من الحصول على النتائج المبينة على التوالي في الوثيقتين 1 و 2.




تركيز المواد الاستقلابية بـ (10^{-6} mol) في كل غرام من العضلة				
ATP	الفوسفوكرياتين	الجليكوجين	الحمض اللبني	
4.6	17	80	1.1	1- حالة راحة
3.4	10	60	30.5	2- سباحة حرة لمسافة 100m (1min)
4.7	16	38	3	3- سباحة حرة لمسافة 1500m (15min)

الوثيقة 1

1- أ. انطلاقاً من الوثيقة 1، حدد (ي) التغيرات التي تطرأ على تركيز المواد الاستقلابية عند كل من سباحي مسافة 100 متر و 1500 متر بعد قيامهما بمجهود عضلي. (1 ن)


ب. اعتماداً على الوثيقة 2، استخرج (ي) المسالك الاستقلابية المعتمدة من طرف العضلة لإنتاج الطاقة عند سباحي مسافة 100 متر و 1500 متر. (1 ن)

● لفهم طريقة تأثير مجهود عضلي طويل المدة على النشاط الاستقلابي للعضلة، نقترح معطيات الوثيقتين 3 و 4.



- على إثر مزاوله سباح لتدارب رياضية منتظمة (سباحة حرة لمسافة 1500m) لمدة 21 أسبوع بمعدل خمس حصص في الأسبوع، لوحظ على مستوى الخلايا العضلية ارتفاع عدد الميتوكوندريات بنسبة 120%، وزيادة في قدها بنسبة تتراوح ما بين 14% و 40%.

- مكن قياس نشاط أنزيمات حلقة كريبس انطلاقاً من مستخلصات عضلات هذا السباح من الحصول على النتائج الممثلة في المبيان جانبه.




أظهر قياس تركيز الحمض اللبني في الدم بدلالة سرعة السباحة عند سباح يمارس تدايب منتظمة وسباح آخر لا يتدرب من الحصول على النتائج الممثلة في المبيان جانبه.

2- باعتمادك على معطيات الوثيقتين 3 و 4 حدد (ي) تأثير التدايب الرياضية على التفاعلات الاستقلابية، ثم فسر (ي) تأثير المجهود العضلي طويل المدة على التفاعلات الاستقلابية للعضلة الهيكلية. (1 ن)

- رغم التأثير السلبي لتناول المنشطات على صحة الرياضيين، يلجأ بعض السباحين إلى تناول منشطات تناسب طبيعة النشاط الرياضي المزاول قصد الرفع من أدائهم الرياضي. لفهم كيفية تأثير بعض المنشطات نقدم شكلي الوثيقة 5.

تم قياس تركيز ATP على مستوى عضلات الفخذ عند سباح مسافة 100m قبل وبعد تناوله لأقراص الكرياتين (منشط) بمقدار 20 غرام في اليوم لمدة خمسة أيام خلال ثلاثة مراحل، وسباح آخر تناول أقراص خالية من الكرياتين. أدى هذا القياس إلى الحصول على النتائج الممثلة في المبيان أسفله.



الشكل ب
■ تناول أقراص خالية من الكرياتين □ تناول أقراص الكرياتين

EPO أو Erythropoïétine هرمون تفرزه الكلية، ويتم تصنيعه واستعماله كمنشطات من طرف سباحي المسافات الطويلة. يعطي الجدول أسفله التغيرات التي تحصل على مستوى دم شخص عادي بعد حقنه بـ EPO.

بعد يومين من حقنه بمادة EPO	قبل الحقن بمادة EPO	
$6 \cdot 10^{12}$	$4,9 \cdot 10^{12}$	عدد الكريات الحمراء في لتر من الدم
200	150	كمية الخضاب الدموي بـ g في لتر من الدم

الشكل أ


الوثيقة 5

3. باستغلالك لمعطيات الوثيقة 5 ومكتسباتك، وضح (ي) تأثير استهلاك كل من EPO والكرياتين على التفاعلات الاستقلابية. (1ن)
يلجأ بعض الأبطال الرياضيين إلى مزاوله التمارين الرياضية في مناطق جبلية (مثل إفران) لتحسين تهويتهم الرئوية، والرفع من عدد كرياتهم الحمراء وكمية خضابهم الدموي.
4. من خلال ما سبق بين (ي) أنه يمكن تحسين الأداء الرياضي دون تناول منشط EPO. (1ن)

التمرين الثاني (3 نقط)

نقل نبتة فول من جديد إلى وسط غني بالتيميدين (T) غير المشع لمدة دورة خلوية واحدة

نقل نبتة فول من وسط عادي إلى وسط غني بالتيميدين (T) المشع لمدة دورة خلوية واحدة




لدراسة بعض مظاهر نقل الخبر الوراثي وتعبيره نقترح المعطيات الآتية:

- خلال كل دورة خلوية، تخضع الخلية لظواهر بيولوجية تساهم في الحفاظ على ثبات الخبر الوراثي عند انتقاله من خلية إلى أخرى. للكشف عن إحدى هذه الظواهر وإبراز أهميتها نقترح التجربة المبينة في الوثيقة 1.

ملحوظة: يدخل التيميدين (T) في تركيب جزيئة ADN.

1. فسر (ي) نتائج التجربة المبينة في الوثيقة 1 معززا جوابك برسم تخطيطي للظاهرة التي تم الكشف عنها. (1.5ن)

● جفاف الجلد من نوع XPB (Xeroderma pigmentosum B) مرض وراثي، يتميز بحساسية مفرطة للأشعة فوق البنفسجية التي تؤدي إلى ظهور جروح على مستوى الجلد والعيون قد تتطور إلى سرطانات، ويرجع هذا المرض إلى فقدان الخلايا لقدرتها على تعديل وإصلاح الخل على مستوى ADN. تؤثر الأشعة فوق البنفسجية على جزيئة ADN، حيث تؤدي إلى تشكل روابط تساهمية بين قاعدتي تيمين (T) متتاليتين من نفس خيط ADN. في الحالة العادية يتم تصحيح هذا الخل بتدخل أنزيم ERCC3 قبل مضاعفة ADN، وتوضح الوثيقة 2 كيفية عمل هذا الأنزيم.



تعطي الوثيقة 3 متتالية النيكلوتيدات لجزء من المورثة المسؤولة عن تركيب أنزيم ERCC3 عند كل من الشخص السليم والشخص المصاب بجفاف الجلد من نوع XPB. وتمثل الوثيقة 4 مستخلصا من جدول الرمز الوراثي.

66	67	68	69	70	71	
CCA	ACT	TGT	GAT	AAC	TGC	} عند شخص عادي الخط غير المنسوخ الخط المنسوخ
GGT	TGA	ACA	CTA	TTG	ACG	
66	67	68	69	70	71	
CCA	ATT	GTG	ATA	ACT	GCA	} عند شخص مصاب بـ XPB الخط غير المنسوخ الخط المنسوخ
GGT	TAA	CAC	TAT	TGA	CGT	
منحى القراءة →						الوثيقة 3

ACC	GUG	UAA	CCU	UGU	GCU	AAU	AUU	UUU	GAU	الوحدات الرمزية
ACU	GUA	UAG	CCA	UGC	GCA	AAC	AUA	UUC	GAC	
ACG	GUG				GCG		AUC			
Thr	Val	Non sens	Pro	Cys	Ala	Asn	Ile	Phe	Asp	الأحماض الأمينية

الوثيقة 4

2. اعتمادا على معطيات الوثائق 2 و 3 و 4، حدد (ي) متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لجزء المورثة المتحكممة في تركيب الأنزيم ERCC3 عند كل من الشخص المصاب والشخص السليم، ثم فسر (ي) الأصل الوراثي لمرض جفاف الجلد من النوع XPB. (1.5 ن)

التمرين الثالث (2 نقط)

تكون أنثى الحمام متغايرة الأمشاج XY والذكر متشابه الأمشاج XX. لفهم كيفية انتقال صفتي لون الريش ولون العيون عند الحمام الروماني، نقترح دراسة نتائج التزاوجات الآتية:

التزاوج 1: تم بين ذكور من سلالة نقية ذات ريش أزرق و عيون سوداء وإناث من سلالة نقية ذات ريش بني و عيون برتقالية. أعطى هذا التزاوج خلفا F_1 يتكون من أفراد كلها ذات ريش أزرق و عيون سوداء.


التزاوج 2: تم بين ذكور من سلالة نقية ذات ريش بني و عيون برتقالية وإناث من سلالة نقية ذات ريش أزرق و عيون سوداء. أعطى هذا التزاوج خلفا F_1 يتكون من 50% ذكور بريش أزرق و عيون سوداء و 50% إناث لها ريش بني و عيون سوداء.

- حل (ي) نتائج التزاوجين 1 و 2، واستخلص (ي) كيفية انتقال الصفتين المدروستين عند الحمام الروماني. (1ن)**
 - مستعينا (ة) بشبكة التزاوج، أعط النتائج المنتظرة لتزاوج ذكور من F_1 مع إناث ذات ريش بني و عيون برتقالية. (1ن)**
- * استعمل الرموز (B,b) للتعبير عن لون الريش و (N,n) للتعبير عن لون العيون.

التمرين الرابع (5 نقط)

احتضنت مراكش، ما بين 7 و 18 نونبر 2016، مؤتمر الأطراف "كوب 22" للأمم المتحدة حول تغير المناخ اتفقت خلاله الدول المشاركة على أجراً وتفعيل بنود اتفاق "كوب 21" المنعقد ببائيس، وتنفيذها لتجنب كوارث بيئية محققة قبل حلول عام 2050 نتيجة استفحال ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك بتقليص ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ 2°C . للوقوف على التزامات المغرب ورؤيته الإستراتيجية في مجال الطاقة ومقارنتها مع تجارب دول أخرى، نقترح دراسة المعطيات الآتية:

● يعتبر CO_2 من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولقد عرف تحريره في الهواء تزايداً مستمراً منذ بداية القرن الماضي. تقدم الوثيقة 1 معطيات حول مساهمة مختلف المصادر الطاقية في الإنتاج العالمي للكهرباء خلال سنة 2006 (الشكل أ)، وكمية CO_2 المحررة في الهواء حسب مختلف المصادر المستعملة في إنتاج الكهرباء (الشكل ب).



1. باستثمارك لشكلي الوثيقة 1:


- أربط (ي) العلاقة بين الاحتباس الحراري وإنتاج الكهرباء. (1.5ن)
- أقترح (ي) إجراءات مناسبة للحد من استفحال ظاهرة الاحتباس الحراري. (0.5ن)

● خلال مؤتمر الأطراف ببائيس (كوب 21) التزم المغرب بتخفيض نسبة انبعاثاته من CO_2 بنسبة 32% في أفق 2030، ولتحقيق ذلك اعتمد المغرب استراتيجية طاقية تركز على تطوير الطاقات المتجددة في إطار رؤية إيكولوجية. تقدم أشكال الوثيقة 2 معطيات تتعلق ببعض المشاريع المنجزة في هذا الشأن.

المحطات المنجزة بين 2000 و 2015	الطاقة الريحية	الطاقة الشمسية
ثمانية محطات بإنتاجية إجمالية تصل إلى 1.060MW	ست محطات بإنتاجية إجمالية تصل إلى 1.660MW	
الهدف المنتظر في أفق 2020	- 14% من الإنتاج الوطني للكهرباء ؛ - تجنب انبعاث 5.6 مليون طن من CO ₂ في السنة.	- 14% من الإنتاج الوطني للكهرباء ؛ - تجنب انبعاث 3,7 مليون طن من CO ₂ في السنة.

الشكل ب: مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب وأهدافها.

الوثيقة 2



الشكل أ: تطور مساهمة مختلف المصادر في إنتاج الكهرباء بالمغرب بين 2009 و 2015، مع توقعات 2020.

2. باستثمارك لمعطيات الوثيقة 2 بين (ي) نجاعة هذه الإجراءات في تفعيل المغرب لالتزاماته في كوب 21. (ن1)

● بخلاف المغرب لجأت العديد من الدول إلى اعتماد الطاقة النووية كبديل عن الطاقة الأحفورية لإنتاج الكهرباء. وقد عرفت بعض المحطات النووية حوادث نتج عنها تسرب الإشعاعات النووية إلى المحيط البيئي. تقدم أشكال الوثيقة 3 معطيات تتعلق ببعض هذه الحوادث.

نوع السرطان	العدد الكلي للحالات	العدد الكلي للوفيات	نسبة الوفيات
سرطان الغدة الدرقية	137000	13700	10%
سرطان الدم	12000	8040	67%
سرطانات أخرى	123000	71340	58%

الشكل ب: تقدير نسبة الوفيات بسبب السرطانات الناتجة عن كارثة تشيرنوبيل.

الوثيقة 3

نوع الإشعاع	تشيرونوبيل *	فوكوشيما **
اليود المشع	4260 PBq	408 PBq
السيزيوم المشع	168 PBq	85 PBq
الغازات النادرة	6533 PBq	6550 PBq

* الوكالة الدولية للطاقة الذرية 2005.
** تقديرات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية.

الشكل أ: كمية الإشعاع الصادرة عن انفجاري تشيرنوبيل وفوكوشيما بوحدة Becquerel (Bq)

3. باستثمارك لمعطيات الوثيقة 3 حدد (ي) آثار استعمال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. (ن1)

4. اعتمادا على ما سبق، أعط رأيك في الاختيارات الطاقية للمغرب مقارنة مع نموذج الطاقة النووية الذي تعتمد دول أخرى. (ن1)

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2017

- عناصر الإجابة -

RR 34

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي



المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه



المادة	علوم الحياة والأرض	مدة الإنجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	المعامل	5

السؤال	عناصر الإجابة المكون الأول (5 نقط)	التنقيط
I	التعاريف : إجابات من قبيل: • الأفيوليت: جزء من غلاف صخري محيطي قديم يوجد بهامش قاري. (تقبل الإجابة المتضمنة لمكونات المركب الأفيوليتي). • بنية مورقة: بنية تكتسبها الصخور المتحولة تتميز بتعاقب أسرة فاتحة وأخرى داكنة.	0.5 ن 0.5 ن
II	1- ذكر ثلاث خصائص بنيوية وصخرية مميزة لسلاسل الطوفو:..... (3×0.25 ن) - وجود الأفيوليت. - وجود تشوهات تكتونية معقدة (سدائم وتراكبات). - وجود رواسب بحرية (صخور الراديولاريت).	0.75 ن
III	الاختيار من متعدد: (4×0.5 ن) (1؛ ج) (2؛ ب) (3؛ ب) (4؛ د)	2 ن
IV	الإسم المناسب لكل شكل: الشكل 1: طية مائلة الشكل 2: طية راقدة الشكل 3: تراكب الشكل 4: فالق عادي الشكل 5: فالق معكوس	1.25 ن

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول (5 ن)

1- أ.	تحديد التغيرات: - عند سباح 100 متر: انخفاض مهم في تركيز الفوسفوكرياتين؛ ارتفاع في تركيز الحمض اللبني؛ انخفاض طفيف في تركيز الكليوجين؛ - عند سباح 1500 متر، انخفاض مهم في تركيز الكليوجين؛ ارتفاع طفيف في تركيز الحمض اللبني؛ انخفاض ضعيف في تركيز الفوسفوكرياتين.	0.5 ن 0.5 ن
ب.	- عند سباح 100 متر: يلاحظ هيمنة مسلك استهلاك الفوسفوكرياتين (85%) حيث تلجأ العضلة إلى استهلاك الفوسفوكرياتين مع اللجوء إلى التخمر اللبني للحصول على ATP. - عند سباح 1500 متر: يلاحظ هيمنة مسلك التنفس (90%) حيث تعتمد العضلة على تفاعلات التنفس للحصول على ATP.	0.5 ن 0.5 ن



2	استثمار الوثائق:	- الوثيقة 3: تؤدي ممارسة التدريبات الرياضية لمدة طويلة الى الرفع من عدد وقد الميتوكوندريات والرفع من نشاط أنزيمات حلقة كريس. - الوثيقة 4: كلما ازدادت سرعة السباحة الا وارتفع تركيز الحمض اللبني في الدم، الا أنه يتم إنتاج كمية أقل من الحمض اللبني عند السباح المتدرب مقارنة مع السباح الذي لا يتدرب. التفسير: عند بذل مجهود طويل المدة (تدريب السباحة 1500 متر)، يتم تحفيز تفاعلات التنفس على حساب تفاعلات التخمر اللبني على مستوى العضلة وذلك نتيجة لارتفاع عدد الميتوكوندريات وقدها، وزيادة في نشاط أنزيمات حلقة كريس.
0.25	0.25	0.50
3	يعمل EPO على الرفع من عدد الكريات الحمراء و كمية الخضاب الدموي ← الرفع من كمية الأوكسجين التي تصل للعضلة ← الرفع من إنتاج ATP عن طريق التنفس .	0.75 0.25
4	تمكن ممارسة التدريبات الرياضية بانتظام من الرفع من عدد الميتوكوندريات ونشاط أنزيمات حلقة كريس، ومزاولة هذه التدريبات في المناطق الجبلية يؤدي إلى الرفع من عدد الكريات الحمراء وكمية الخضاب الدموي (نفس تأثير EPO) وتحسين التهوية الرئوية، ويترتب عن ذلك الرفع من إنتاج ATP على مستوى خلاياه العضلية عن طريق التنفس مما يسمح له بتحسين أدائه الرياضي دون اللجوء إلى تناول المنشطات.	1 ن
التمرين الثاني (3 ن)		
1	- زرع نبتة الفول عادية في وسط غني بالتمديد المشع ← إدماج التمددين المشع في ADN خلال مضاعفته ← يصبح نصف كل جزيئة ADN مشع ← تظهر الصبغيات مكونة من صبيغين مشعين في الدورة الخلوية الأولى.	0.5
2	- نقل النبتة السابقة الى وسط عادي ← إدماج التمددين غير مشع خلال مضاعفة ADN في الدورة الخلوية الثانية ← تشكل جزيئتين من ADN: واحدة تتكون من خيطين غير مشعين والثانية بها خيط عادي واخر مشع ← تظهر الصبغيات نصف مشعة.	0.5 0.5
2	- متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لجزء المورثة المتحركة في تركيب بروتين ERCC3 عند الشخص السليم : ARNm : CCA ACU UGU GAU AAC UGC متتالية الأحماض الأمينية: Pro - Thr - Cys - Asp - Asn - Cys - متتالية الأحماض الأمينية المطابقة لجزء المورثة المتحركة في تركيب بروتين ERCC3 عند الشخص المصاب : ARNm : CCA AUU GUG AUA ACU GCA متتالية الأحماض الأمينية: Pro - Ile - Val - Ile - Thr - Ala	0.25 0.25 0.25 0.25 0.5
تفسير الأصل الوراثي لمرض جفاف الجلد : حدوث طفرة على مستوى الثلاثية 67 ← ضياع النكليوتيد G على مستوى خيط ADN المنسوخ (يقبل ضياع النكليوتيد C على مستوى الخيط غير المنسوخ) ← تركيب بروتين ERCC3 غير فعال ← عدم تعديل وإصلاح الخلل على مستوى ADN ← ظهور مرض جفاف الجلد.		

الصفحة 3 4		RR 34	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2017 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية																					
التمرين الثالث (2 ن)																								
0.25 ن	1	- استثمار نتائج التزاوج الأول والتزاوج الثاني (التزاوج العكسي): - دراسة انتقال صفتين وراثيتين ← يتعلق الأمر بهجونة ثنائية. - رغم كون الآباء من سلالة نقية بالنسبة للصفات المدروستين، تختلف النتائج المحصل عليها بالنسبة لصفة لون الريش في حين تظل النتائج نفسها بالنسبة لصفة لون العيون عند الذكور والإناث: + المورثة المسؤولة عن لون الريش مرتبطة بالصبغي الجنسي X، والمورثة المسؤولة عن لون العيون غير مرتبطة بالجنس. + المورثتان المدروستان مبهتقتان. + التحليل المسؤول عن ريش أزرق سائد B على التحليل المسؤول عن ريش بني متنحي b والتحليل المسؤول عن عيون سوداء سائد N على التحليل المسؤول عن عيون برتقالية متنحي n...																						
0.25 ن	2	- النتائج المنتظرة لتزاوج ذكور من F1 وإناث ذات ريش بني وعيون برتقالية : الآباء : أنثى × ذكر المظهر الخارجي: [nb] [NB] النمط الوراثي: n/n ; X _b Y N//n ; X _B X _b الأمشاج: 50% n/Y ; 50% n/X _b 25% N/X _B ; 25% N/X _b ; 25% n/X _B ; 25% n/X _b شبكة التزاوج: <table><tr><td>γ♂ \ γ♀</td><td>N/ X_B 25%</td><td>N/ X_b 25%</td><td>n/ X_B 25%</td><td>n/X_b 25%</td></tr><tr><td>n/ X_b 50%</td><td>N//n X_BX_b [NB]</td><td>N//n X_bX_b [Nb]</td><td>n//n X_BX_b [NB]</td><td>n//n ; X_bX_b [nb]</td></tr><tr><td>n/ Y 50%</td><td>N//n X_BY [NB]</td><td>N//n X_bY [Nb]</td><td>n//n X_BY [NB]</td><td>n//n ; X_bY [nb]</td></tr><tr><td></td><td>25% [NB]</td><td>25% [Nb]</td><td>25% [NB]</td><td>25% [nb]</td></tr></table> سيتم الحصول على أربعة مظاهر خارجية بنسب 25% لكل مظهر.			γ♂ \ γ♀	N/ X _B 25%	N/ X _b 25%	n/ X _B 25%	n/X _b 25%	n/ X _b 50%	N//n X _B X _b [NB]	N//n X _b X _b [Nb]	n//n X _B X _b [NB]	n//n ; X _b X _b [nb]	n/ Y 50%	N//n X _B Y [NB]	N//n X _b Y [Nb]	n//n X _B Y [NB]	n//n ; X _b Y [nb]		25% [NB]	25% [Nb]	25% [NB]	25% [nb]
γ♂ \ γ♀	N/ X _B 25%	N/ X _b 25%	n/ X _B 25%	n/X _b 25%																				
n/ X _b 50%	N//n X _B X _b [NB]	N//n X _b X _b [Nb]	n//n X _B X _b [NB]	n//n ; X _b X _b [nb]																				
n/ Y 50%	N//n X _B Y [NB]	N//n X _b Y [Nb]	n//n X _B Y [NB]	n//n ; X _b Y [nb]																				
	25% [NB]	25% [Nb]	25% [NB]	25% [nb]																				
0.5 ن	التمرين الرابع (5 ن)																							
0.5 ن	أ.1	الشكل أ: 68% من الانتاج الكهربائي العالمي يتم انطلاقا من المصادر الأحفورية (الفحم والغاز والبترو) . الشكل ب: انتاج الكهرباء انطلاقا من المصادر الأحفورية (البترو، الفحم والغاز) هي الأكثر تحريرا لـ CO ₂ . انتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على المصادر الأحفورية ينتج عنه تحرير كميات كبيرة من CO ₂ الذي يعتبر من الغازات الدفينة مما يتسبب في استفحال ظاهرة الاحتباس الحراري.																						
0.5 ن	ب.1	إجرائين من قبيل: - الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. - الاعتماد على الطاقة النووية. - تخفيض الاعتماد على الطاقة الأحفورية.																						



الصفحة 4 4	RR 34	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة الاستدراكية 2017 - عناصر الإجابة - مادة: علوم الحياة والأرض - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية
1ن		2. تتمثل نجاعة الإجراءات المتخذة من طرف المغرب للالتزام بتعهداته في كوب 21 في تخفيض نسبة مساهمة المصادر الأحفورية في انتاج الطاقة الكهربائية (الشكل أ)، والرفع من مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وذلك من خلال تشييده لمحطات الطاقة الريحية وأخرى للطاقة الشمسية (الشكل ب)، وهو ما سيمكن المغرب من خفض انبعاثاته من CO₂.
1ن		3. - عند اعتماد الطاقة النووية يمكن أن تقع حوادث على مستوى المحطات النووية ينتج عنها تسرب الاشعاعات (اليود والسيزيوم المشعين) الى المحيط البيئي وبالتالي حدوث تلوث نووي ينعكس سلبا على صحة الانسان حيث ترتفع نسبة السرطانات وبالتالي ارتفاع عدد الوفيات.
1ن		4 - يقبل أي جواب يدخل في خانة مهارة التعبير عن الرأي مع التبرير . - رغم كون المصادر النووية توفر طاقة كهربائية مهمة ، الا أن الاخطار التي يمكن ان تنجم عن وقوع حوادث على مستوى المحطات النووية تكون عواقبها وخيمة على الأوساط البيئية وعلى صحة الإنسان، وبالتالي فاعتماد المغرب على مصادر الطاقة المتجددة التي توفر طاقة كهربائية أقل، إلا انها تظل صديقة للبيئة حيث تساهم في التنمية المستدامة دون أن تشكل خطرا على الأوساط البيئية أو على صحة الانسان.