

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2017

- الموضوع -

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵖⵔⴰⵏ  
ⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵔⵎⴰⵙⵉⵜ  
ⵏ ⵉⵔⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵔⵎⴰⵙⵉⵜ  
ⵏ ⵉⵔⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵔⵎⴰⵙⵉⵜ



السلطة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني  
والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

RS 26

2	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
4	المعامل	مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدير المحاسباتي (باللغتين العربية والفرنسية)	الشعبة أو المسلك

## Instructions au candidat(e)

## تعليمات للمترشح(ة)

**Important : Le candidat est invité à lire et suivre attentivement ces recommandations.**

هام : يتعين على المترشح قراءة هذه التوجيهات بدقة والعمل بها.

Le document que vous avez entre les mains est de 5 pages : la première est réservée aux recommandations, les pages 2 et 3 sont réservées au sujet en langue arabe et les pages 4 et 5 au sujet en langue française. Choisissez une des deux langues pour répondre aux questions.

الوثيقة التي بين يديك من 5 صفحات: الأولى منها خاصة بالتوجيهات، والصفحتان 2 و 3 للموضوع باللغة العربية، والصفحتان 4 و 5 لنفس الموضوع باللغة الفرنسية. اختر إحدى اللغتين للإجابة على الأسئلة.

• Il vous est suggéré de répondre aux questions du sujet avec précision et soin ;

• يرجى منك الإجابة عن أسئلة الموضوع بما تستحقه من دقة وعناية؛

• Il vous est autorisé d'utiliser la calculatrice scientifique non programmable ;

• يسمح لك باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة؛

• Vous devez justifier les résultats ( Par exemple : lors du calcul des limites , lors du calcul des probabilités , ...);

• ينبغي عليك تعليل النتائج (مثلا : عند حساب النهايات، عند حساب الاحتمالات،...);

• Vous pouvez répondre aux exercices selon l'ordre que vous choisissez , mais veuillez numéroter les exercices et les questions tels qu'ils le sont dans le sujet;

• يمكنك الإجابة على التمارين وفق الترتيب الذي تختاره (تختارينه)، لكن يتعين عليك في ترقيم أجوبتك، اعتماد نفس ترقيم التمارين والأسئلة، الوارد في الموضوع؛

• Veillez à la bonne présentation de votre copie et à une écriture lisible;

• ينبغي عليك العمل على حسن تقديم الورقة والكتابة بخط مقروء؛

• Il est souhaitable que les pages soient numérotées pour faciliter la correction;

• يستحسن ترقيم صفحات أوراق التحرير ضمنا لتيسير عملية التصحيح؛

• L'écriture au stylo rouge est à éviter;

• يتعين تجنب الكتابة بقلم أحمر؛

• Assurez-vous que vous avez traité tous les exercices avant de quitter la salle d'examen.

• تحقق(ي) من معالجتك لكل تمارين الموضوع قبل مغادرة قاعة الامتحان.

**التمرين الأول : (4.5 نقط)**

نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  المعرفة بما يلي :  $u_0 = 2$  و  $u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3}$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

0.5 1.أ. احسب  $u_1$  و  $u_2$

0.75 1.ب. تحقق من أن  $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3}$  ثم بين بالترجع أن لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  :  $u_n > 1$

0.5 1.ج. بين أن لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  :  $u_{n+1} - u_n = 2 \left( \frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right)$

0.5 1.د. استنتج أن  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  تناقصية وأنها متقاربة .

2. نعتبر المتتالية  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  المعرفة بما يلي :  $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

0.25 1.أ. تحقق أن لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  :  $v_n \neq 1$

0.25 2.ب. احسب  $v_0$

0.5 2.ج. بين أن المتتالية  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  هندسية أساسها  $\frac{1}{5}$

0.25 2.د. احسب  $v_n$  بدلالة  $n$

0.25 1.أ. بين أن  $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$

0.5 1.ب. استنتج أن :  $u_n = \frac{1 + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{5} \right)^n}{1 - \frac{1}{3} \left( \frac{1}{5} \right)^n}$

0.25 3.ج. احسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

**التمرين الثاني : (4 نقط)**

يحتوي صندوق على ثلاث كرات بيضاء تحمل الأعداد 0 ؛ 1 ؛ 2 وكرتين لونهما أسود تحملان العددين 1 ؛ 2 ، كلها غير قابلة للتمييز باللمس.

نسحب عشوائيا بالتتابع وبدون إحلال كرتين من الصندوق.

1. نعتبر الحدثين  $A$  و  $B$  التاليين :

$A$  : " الكرتان المسحوبتان تحملان العدد 1 "

$B$  : " سحب كرة بيضاء في المرة الأولى "

0.5 1.أ. بين أن  $p(A) = \frac{1}{10}$

1 1.ب. احسب احتمال الحدث  $B$  وبين أن  $p(A \cap B) = \frac{1}{20}$

0.5 1.ج. هل الحدثان  $A$  و  $B$  مستقلان ؟ علل جوابك .

2. ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي جداء العددين اللذين تحملهما الكرتان المسحوبتان.

1.أ. انقل الجدول جانبه على ورقة تحريرك ثم أتمم ملاء

1.5 معللا جوابك.

$X = x_i$	0	1	2	4
$p(X = x_i)$	$\frac{8}{20}$			

0.5 2.ب. احسب  $E(X)$  الأمل الرياضي للمتغير العشوائي  $X$

**التمرين الثالث : (1.5 نقطة)**

نضع :  $I = \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$  و  $J = \int_0^1 \frac{x^3}{x^2+1} dx$

1. احسب  $I$  0.5

2. احسب  $I+J$  0.5

3. استنتج أن :  $J = \frac{1}{2}(1 - \ln 2)$  0.5

**التمرين الرابع : (10 نقط)**

نعتبر الدالة العددية  $f$  للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على  $IR^*$  بما يلي :  $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)e^x$  وليكن  $(C_f)$  تمثيلها المبياني

في معلم متعامد ممنظم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  وبين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$  ثم أعط تاويلا هندسيا لهذه النتيجة . 1.75

1. احسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ثم أعط تاويلا هندسيا لهذه النتيجة . 0.75

1. بين أن  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  وأن  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  ثم أعط تاويلا هندسيا لهذه النتيجة . 1.75

2. أ. بين أن لكل  $x$  من  $IR^*$  :  $f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2} e^x$  1

2. بين أن :  $f'(x) > 0$  لكل  $x$  من  $IR^*$  1

2. استنتج منحنى تغيرات الدالة  $f$  على  $]-\infty; 0[$  ثم على  $]0; +\infty[$  0.5


2. احسب  $f(1)$  ثم ضع جدول تغيرات الدالة  $f$  1.25

3. في الشكل أسفله  $(C_f)$  هو التمثيل المبياني للدالة  $f$

1. أعط معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  في النقطة ذات الأضصول 1 1

3. حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة  $f(x) = 2$  0.5

3. حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة :  $f(x) = -2$  0.5



## الثانية اقتصاد وتدبير

### تصحيح الامتحان الوطني الاستدراكي 2017

التمرين الأول : (4,5 ن )

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي : $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3}$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$	
1. أ- أحسب $u_1$ و $u_2$	0,5
1. ب- تحقق من أن $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3}$ ثم بين بالترجع أن لكل $n$ من $\mathbb{N}$ : $u_n > 1$	0,75
1. ج- بين أن لكل $n$ من $\mathbb{N}$ : $u_{n+1} - u_n = 2 \left( \frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right)$	0,5
1. د- استنتج أن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ تناقصية و أنها متقاربة	0,5
2. نعتبر المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي : $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$	
2. أ- تحقق أن لكل $n$ من $\mathbb{N}$ : $v_n \neq 1$	0,25
2. ب- أحسب $v_0$	0,25
2. ج- بين أن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية أساسها $\frac{1}{5}$	0,5
2. د- أحسب $v_n$ بدلالة $n$	0,25
3. أ- بين أن $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$	0,25
3. ب- استنتج أن : $u_n = \frac{1 + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{5} \right)^n}{1 - \frac{1}{3} \left( \frac{1}{5} \right)^n}$	0,5
3. ج- أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	0,25

التمرين الثاني : ( 4 ن )

يحتوي صندوق على ثلاث كرات بيضاء تحمل الأعداد 0، 1، 2 و كرتين لونهما أسود تحملان العددين 1، 2 ، كلها غير قابلة للتمييز باللمس .  
نسحب عشوائيا بالتتابع و بدون إحلال كرتين من الصندوق .

1. نعتبر الحدثين  $A$  و  $B$  التاليين :

"  $A$  " الكرتان المسحوبتان تحملان العدد 1 "

"  $B$  " سحب كرة بيضاء في المرة الأولى "

1. أ- بين أن  $p(A) = \frac{1}{10}$  0,5

1. ب- أحسب احتمال الحدث  $B$  و بين أن  $p(A \cap B) = \frac{1}{20}$  1

1. ج- هل الحدثان  $A$  و  $B$  مستقلان ؟ علل جوابك . 0,5

2. ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يساوي جداء العددين اللذين تحملهما الكرتان المسحوبتان .

2. أ- أنقل الجدول جانبه إلى ورقة تحريرك ثم أتمم 1,5

$x_i$	0	1	2	4
$p(X = x_i)$				

معللا جوابك

2. ب- أحسب  $E(X)$  الأمل الرياضي للمتغير العشوائي  $X$  0,5

التمرين الثالث : ( 1,5 ن )

نضع :  $I = \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$  و  $J = \int_0^1 \frac{x^3}{x^2+1} dx$

1. أحسب  $I$  0,5

2. أحسب  $I + J$  0,5

3. استنتج أن  $J = \frac{1}{2}(1 - \ln 2)$  0,5


التمرين الرابع : ( 10 ن )

نعتبر الدالة العددية  $f$  للمتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بما يلي :  $f(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right)e^x$  و ليكن

$(C_f)$  تمثيلها المبياني في معلم متعامد ممنظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1. أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و بين أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$  ثم اعط تأويلا هندسيا لهذه النتيجة . 1,75

1. ب- أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم أعط تأويلا هندسيا لهذه النتيجة .	0,75
1. ج- بين أن $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ وأن $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$ ثم أعط تأويلا هندسيا لهذه النتيجة .	1,75
2. أ- بين أن لكل $x$ من $\mathbb{R}^*$ : $f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)}{x^2} e^x$	1
2. ب- بين أن $f'(x) > 0$ لكل $x$ من $\mathbb{R}^*$	1
2. ج- استنتج منحنى تغيرات الدالة $f$ على $]-\infty, 0[$ ثم على $]0, +\infty[$	0,5
2. د- أحسب $f(1)$ ثم ضع جدول تغيرات الدالة $f$	1,25
3. في الشكل أسفله $(C_f)$ هو التمثيل المبياني للدالة $f$	
3. أ- أعط معادلة المماس $(T)$ للمنحنى $(C_f)$ في النقطة ذات الأضلاع 1	1
3. ب- حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة $f(x) = 2$	0,5
3. ج- حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة : $f(x) = -2$	0,5



تصحيح التمرين الأول

$$u_1 = \frac{3u_0 + 2}{2u_0 + 3} = \frac{3(2) + 2}{2(2) + 3} = \frac{8}{7} \quad \text{1. أ.}$$

$$u_2 = \frac{3u_1 + 2}{2u_1 + 3} = \frac{3\left(\frac{8}{7}\right) + 2}{2\left(\frac{8}{7}\right) + 3} = \frac{\frac{38}{7}}{\frac{37}{7}} = \frac{38}{37}$$

1. ب-

✓ ليكن  $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} - 1 = \frac{3u_n + 2 - 2u_n - 3}{2u_n + 3} = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3} \quad \text{لدينا :}$$

$$\text{إذن : } u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3} \quad \text{لكل } n \text{ من } \mathbb{N}$$

✓

• من أجل  $n = 0$  :

$$u_0 = 2 \quad \text{لدينا}$$

$$u_0 > 1 \quad \text{إذن :}$$

• ليكن  $n \in \mathbb{N}$

نفترض أن  $u_n > 1$

و نبين أن  $u_{n+1} > 1$  ؟

$$u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{2u_n + 3} \quad \text{لدينا :}$$

و حسب الافتراض  $u_n > 1$  إذن  $u_n - 1 > 0$  و  $2u_n + 3 > 0$

$$\text{إذن } \frac{u_n - 1}{2u_n + 3} > 0 \quad \text{إذن } u_{n+1} - 1 > 0$$

$$\text{و منه } u_{n+1} > 1$$

• نستنتج أن  $u_n > 1$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

1. ج- ليكن  $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} - u_n = \frac{3u_n + 2 - 2u_n^2 - 3u_n}{2u_n + 3} = \frac{2(1 - u_n^2)}{2u_n + 3} = 2 \left( \frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right) : \text{لدينا}$$

$$u_{n+1} - u_n = 2 \left( \frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right) : \text{إن : لكل } n \text{ من } \mathbb{N}$$

1. د -

✓ ليكن  $n \in \mathbb{N}$

لدينا :  $u_n > 1$  : إذن  $1 - u_n^2 < 0$  و  $2u_n + 3 > 0$

$$\text{إذن } 2 \left( \frac{1 - u_n^2}{2u_n + 3} \right) < 0$$

و منه لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  :  $u_{n+1} - u_n < 0$

و بالتالي  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  تناقصية

✓ بما أن  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  تناقصية و مصغرة (بالعدد 1) فإن  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متقاربة

2. أ- نفترض أنه يوجد  $n$  من  $\mathbb{N}$  بحيث :  $v_n = 1$

$$\text{إذن : } \frac{u_n - 1}{u_n + 1} = 1$$

$$\text{إذن : } u_n - 1 = u_n + 1$$

$$\text{إذن } -1 = 1$$

و هذا غير ممكن

و بالتالي : لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  :  $v_n \neq 1$

$$2. \text{ ب- } v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3}$$

2. ج - ليكن  $n \in \mathbb{N}$  :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{\frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} - 1}{\frac{3u_n + 2}{2u_n + 3} + 1} = \frac{\frac{u_n - 1}{2u_n + 3}}{\frac{5u_n + 5}{2u_n + 3}} = \frac{u_n - 1}{5(u_n + 1)} = \frac{1}{5} v_n : \text{لدينا}$$

$$\text{إذن : لكل } n \text{ من } \mathbb{N} : v_{n+1} = \frac{1}{5} v_n$$

ومنه :  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  هندسية أساسها  $q = \frac{1}{5}$

2. د- ليكن  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\text{لدينا : } v_n = v_0 \cdot q^n$$

إذن :  $v_n = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$

3. أ- ليكن  $n \in \mathbb{N}$  :  
لدينا :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} \Leftrightarrow u_n - 1 = (u_n + 1)v_n$$

$$\Leftrightarrow u_n - 1 = u_n v_n + v_n$$

$$\Leftrightarrow u_n - u_n v_n = 1 + v_n$$

$$\Leftrightarrow u_n (1 - v_n) = 1 + v_n$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$$

إذن : لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  :  $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$

3. ب- ليكن  $n \in \mathbb{N}$  :

لدينا :  $u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$  و  $v_n = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n$

إذن : لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  :  $u_n = \frac{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n}$

3. ج- بما أن  $-1 < \frac{1}{5} < 1$  فإن  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0$

فإن :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n} = 1$

تصحيح التمرين الثاني

التجربة " سحب بالتتابع و بدون إحلال كرتين من الصندوق "   
 ليكن  $\Omega$  كون إمكانيات هذه التجربة

$$\text{لدينا : } \text{card } \Omega = A_5^2 = 20$$

1. أ- " A الكرتان المسحوبتان تحملان العدد 1 "

$$\text{card } A = A_2^2 = 2$$

$$p(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

1. ب-

✓ " B سحب كرة بيضاء في المرة الأولى "

$$\text{card } B = A_3^1 \times A_4^1 = 3 \times 4 = 12$$

$$p(B) = \frac{\text{card } B}{\text{card } \Omega} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

✓ "  $A \cap B$  الكرتان المسحوبتان تحملان العدد 1 و الكرة المسحوبة في المرة الأولى بيضاء "

$$\text{card } (A \cap B) = A_1^1 \times A_1^1 = 1$$

$$p(A \cap B) = \frac{\text{card } (A \cap B)}{\text{card } \Omega} = \frac{1}{20}$$

$$1. ج- لدينا :  $p(A \cap B) = \frac{1}{20}$  و  $p(A) \times p(B) = \frac{1}{10} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{50}$$$

بما أن  $p(A \cap B) \neq p(A) \times p(B)$  فإن الحدثين A و B غير مستقلين .

2. أ-

$$\begin{cases} 0, \bar{0} \\ \bar{0}, 0 \end{cases} \rightarrow X = 0$$

$$p(X = 0) = \frac{2(A_1^1 \times A_4^1)}{20} = \frac{2 \times 1 \times 4}{20} = \frac{2}{5}$$

$$1, 1 \rightarrow X = 1$$

$$p(X = 1) = p(A) = \frac{1}{10}$$

$$\begin{cases} 1, 2 \\ 2, 1 \end{cases} \rightarrow X = 2$$

$$p(X = 2) = \frac{2(A_2^1 \times A_2^1)}{20} = \frac{2 \times 2 \times 2}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

$$2,2 \rightarrow X = 4$$

$$p(X = 4) = \frac{A_2^2}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

$x_i$	0	1	2	4
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

2. ب- الأمل الرياضي :

$$E(X) = \left(0 \times \frac{2}{5}\right) + \left(1 \times \frac{1}{10}\right) + \left(2 \times \frac{2}{5}\right) + \left(4 \times \frac{1}{10}\right) = \frac{1}{10} + \frac{4}{5} + \frac{4}{10} = \frac{13}{10}$$

### تصحيح التمرين الثالث

$$I = \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \left[ \ln|x^2+1| \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{2} \ln(1) = \frac{1}{2} \ln(2) \quad 1.$$

$$I + J = \int_0^1 \frac{x^3}{x^2+1} dx + \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{x^3+x}{x^2+1} dx = \int_0^1 \frac{x(x^2+1)}{x^2+1} dx = \int_0^1 x dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \quad 2.$$

$$J = \frac{1}{2}(1 - \ln 2) \text{ و منه } J = \frac{1}{2} - I = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln(2) \text{ إذن } I + J = \frac{1}{2} \quad 3. \text{ لدينا :}$$

### تصحيح التمرين الرابع

1. أ-

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) e^x = +\infty \quad \checkmark \text{ لدينا :}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) = 1 \text{ لأن :} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \end{array} \right.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) e^x = +\infty \quad \checkmark \text{ لدينا :}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \end{array} \right. \quad \text{لأن}$$

التأويل الهندسي:  $(C_f)$  يقبل فرعا شلجيميا في اتجاه محور الأرتيب بجوار  $+\infty$

1.ب-

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) e^x = 0 \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{x-1}{x} \right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \end{array} \right. \quad \text{لأن :}$$

التأويل الهندسي:  $(C_f)$  يقبل مقاربا أفقيا معادلته  $y = 0$  بجوار  $-\infty$

1.ج-

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left( \frac{x-1}{x} \right) e^x = +\infty \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left( \frac{x-1}{x} \right) = +\infty \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} e^x = 1 \end{array} \right. \quad \text{لأن :}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left( \frac{x-1}{x} \right) e^x = -\infty \quad \checkmark$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left( \frac{x-1}{x} \right) = -\infty \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} e^x = 1 \end{array} \right. \quad \text{لأن :}$$

التأويل الهندسي:  $(C_f)$  يقبل مقاربا عموديا معادلته  $x = 0$

2. أ- ليكن  $x \in \mathbb{R}^*$   
لدينا :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( \left( \frac{x-1}{x} \right) e^x \right)' \\ &= \left( \frac{x-1}{x} \right)' e^x + \left( \frac{x-1}{x} \right) (e^x)' \\ &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{x^2} e^x + \frac{x-1}{x} e^x \\ &= \frac{1}{x^2} e^x + \frac{x-1}{x} e^x \\ &= \left( \frac{1+x^2-x}{x^2} \right) e^x \\ f'(x) &= \frac{(x^2-x+1)}{x^2} e^x : \text{ إذن : لكل } x \text{ من } \mathbb{R}^* \end{aligned}$$

2. ب- ليكن  $x \in \mathbb{R}^*$

$$f'(x) = \frac{(x^2-x+1)}{x^2} e^x \text{ لدينا}$$

ولدينا :  $e^x > 0$  و  $x^2 > 0$

إذن إشارة  $f'(x)$  هي إشارة  $x^2 - x + 1$

لدينا :  $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(1) = 1 - 4 = -3 < 0$  إذن  $x^2 - x + 1 > 0$

وبالتالي :  $f'(x) > 0$  لكل  $x$  من  $\mathbb{R}^*$

2. ج- على  $]-\infty, 0[$  : بما أن  $f'(x) > 0$  فإن  $f$  تزايدية قطعا

و على  $]0, +\infty[$  : بما أن  $f'(x) > 0$  فإن  $f$  تزايدية قطعا

2. د-

$$f(1) = \frac{1-1}{1} e^1 = 0 \text{ لدينا } \checkmark$$

$\checkmark$  جدول تغيرات  $f$  :

$x$	$-\infty$	$0$	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	$0$	$+\infty$	$+\infty$

3. أ- معادلة المماس ( $T$ ) للمنحنى ( $C_f$ ) في النقطة ذات الأفصول 1 :

$$y = f'(1).(x - 1) + f(1)$$

$$\text{لدينا : } f(1) = 0 \text{ و } f'(1) = e$$

$$\text{إنن : } y = e.(x - 1) + 0$$

$$\text{إنن : } (T) : \boxed{y = ex - e}$$

3. ب- مبيانيا عدد حلول المعادلة  $f(x) = 2$  هو عدد نقط تقاطع ( $C_f$ ) و المستقيم الأفقي الذي معادلته  $y = 2$  :  
المعادلة تقبل حلين .

3. ج- مبيانيا عدد حلول المعادلة  $f(x) = -2$  هو عدد نقط تقاطع ( $C_f$ ) و المستقيم الأفقي الذي معادلته  $y = -2$  :  
المعادلة تقبل حلا وحيدا .

つづく